


1. เคาะผงยาในขวดให้ร่วน ปองกันผงยาเกาะตัว
เมื่อเทน้ำลงไป และเพื่อให้ยาละลายได้ง่าย



2. เปิดฝาขวด ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเติมลงไป ในขวดยา
ประมาณครึ่งขวด ปิดฝาขวด เขย่าจนผงยากระจายตัวในน้ำ



3. เปิดฝาขวดยา เติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วลงในขวดจนถึงขีดที่
กำหนด ปิดฝาขวด และเขย่าจนยากระจายตัวดี



4. เปิดฝาขวดยาและตวงยาตามปริมาณที่แพทย์สั่งให้เด็ก
รับประทาน ควรใช้ช้อนตวงยา และเขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง



5. กรณีได้รับยามากกว่า 1 ขวด ต้องรอให้รับประทานยา
ขวดแรกหมดก่อนจึงผสมยาขวดที่ 2

6. ยาที่ผสมแล้ว เก็บไว้ได้นาน 7 วัน นอกตู้เย็น, หากเก็บใน
ตู้เย็น ให้เก็บช่องธรรมดา(ห้ามแช่แข็ง) เก็บได้นาน 14 วัน

7. ยาผงผสมน้ำในเด็ก สวมใหญ่เป็นยาปฏิชีวนะ

ต้องกินยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด หากเกิดผื่นแดง
ระคายเคืองหรือบวม ใหญ่หยุดใช้ยาทันทีและมาพบแพทย์
พร้อมกับนำยามาด้วย



1. เคาะผงยาในขวดให้ร่วน ปองกันผงยาเกาะตัว
เมื่อเทน้ำลงไป และเพื่อให้ยาละลายได้ง่าย



2. เปิดฝาขวด ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเติมลงไป ในขวด
ยาประมาณครึ่งขวด ปิดฝาขวด เขย่าจนผงยากระจายตัวในน้ำ



3. เปิดฝาขวดยา เติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วลงในขวด
จนถึงขีดที่กำหนด ปิดฝาขวด และเขย่าจนยากระจายตัวดี



4. เปิดฝาขวดยาและตวงยาตามปริมาณที่แพทย์สั่งให้
เด็กรับประทาน ควรใช้ช้อนตวงยา และเขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง



5. กรณีได้รับยามากกว่า 1 ขวด ต้องรอให้
รับประทานยาขวดแรกหมดก่อนจึงผสมยาขวดที่ 2

6. ยาที่ผสมแล้ว เก็บไว้ได้นาน 7 วัน นอกตู้เย็น, หาก
เก็บในตู้เย็น ให้เก็บช่องธรรมดา(ห้ามแช่แข็ง) เก็บได้นาน 14 วัน

7. ยาผงผสมน้ำในเด็ก สวมใหญ่เป็นยาปฏิชีวนะ

ต้องกินยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด หากเกิดผื่นแดง
ระคายเคืองหรือบวม ใหญ่หยุดใช้ยาทันทีและมาพบแพทย์
พร้อมกับนำยามาด้วย