

รายการยาในบัญชียา รพ.สต. CUPพาน ประจำปี 2566

ที่	รายการยา	หน้า
1	Albendazole 200 mg. tab	4
2	Albendazole 100 mg./ 5 ml. (10 ml) syr	4
3	Alcohol 70 % 450ml	4
4	Alcohol 95 % 450ml	4
5	Alcohol hand gel 70 %	4
6	Ammonium carbonate 60 ml. mixt	2
7	Amoxicillin 250 mg. cap	4
8	Amoxicillin 500 mg. cap	4
9	Amoxicillin 125 mg./ 5 ml. (60ml) dry syr	4
10	Antacid tab	1
11	Antacid gel 240 ml.	1
12	Antazolin Hcl+Tetrahydrozoline Hcl ( <b>Hista-Oph</b> ) eye drop 0.5 %	7
13	Aromatic ammonia 450 ml. ( bot )	2
14	Benzyl benzoate 450 ml. ( bot )	9
15	Betahistine mesilate 6 mg tab	3
16	Bisacodyl 5 mg. tab	2
17	Calamine lotion 60 ml.	9
18	Calcium carbonate 600 mg. tab	6
19	Chloramphenicol eye drop 0.5%	7
20	Chlorhexidine gluconate scrub 4 % ( 45 ml. )	4
21	Chlorpheniramine ( <b>CPM</b> ) 4 mg. tab	2
22	Chlorpheniramine ( <b>CPM</b> ) 2 mg./ 5 ml. syr (60ml)	2
23	Clotrimazole cream 1% ( 5 gm. )	9
24	Clotrimazole vg. Suppo	5
25	Co-trimoxazole 200+40 mg./ 5 ml. (60ml) susp	4
26	Co-trimoxazole 400+80 mg. tab	4
27	Dextromethorphan 15 mg. tab	2
28	Diclofenac 25 mg. tab	7
29	Dicloxacillin 250 mg. cap	4
30	Dicloxacillin 62.5 mg./ 5 ml. (60ml) dry syr	4
31	Dimenhydrinate 50 mg. tab	3
32	Dimenhydrinate 50 mg./ml. sterile sol	3

รายการยาในบัญชียา รพ.สต. CUPพาน ประจำปี 2566

ที่	รายการยา	หน้า
33	DMPA sterile sol (Medroxyprogesterone 3 ml.)	5
34	Domperidone 10 mg. tab	1,3
35	Domperidone 5 mg./ 5 ml. (30ml) susp	1,3
36	dT vaccine 0.5 ml. (amp.)	10
37	D-5-S/2 1000 ml. sterile sol	5
38	Ferrous fumarate 200 mg. tab	6
39	Ferrous fumarate drop. 15 ml susp	6
40	Folic acid 5 mg. tab	5,6
41	Glyceryl guaiacolate 100 mg. tab	2
42	Glyceryl guaiacolate 60 ml. syr	2
43	Hydrogen peroxide 7.5 % 450 ml.	4
44	Hydroxyzine 10 mg. tab	2,3
45	Hyoscine 10 mg. tab	1
46	Hyoscine 20 mg./ml. sterile sol (1 ml)	1
47	Ibuprofen 200 mg. tab	3,7
48	Ibuprofen 400 mg. tab	3,7
49	Ibuprofen 100 mg./ 5 ml. (30ml) susp	3,7
50	Ipratropium + Fenoterol sol for nb (4ml) <b>Berodual Forte</b>	2
51	Lidocaine 2% in 50 ml. sterile sol	11
52	M. carminative 180 ml. Mixt	1
53	M. tussive 60 ml. Mixt	2
54	Metronidazole 400 mg. tab	4
55	<b>MOM</b> (magnesium hydroxide) 240 ml. susp	2
56	MTV tab	6
57	MTV 60 ml. Syr	5
58	Niclosamide 500 mg. tab	4
59	Norfloxacin 400 mg. tab	4
60	Nystatin oral susp (12ml)	4
61	NSS 1000 ml. sterile sol.	5,8
62	NSS 100 ml. Irrigation sol.	5,8
63	NSS 1000 ml. Irrigation sol.	5,8
64	Omeprazole 20 mg. cap	1
65	<b>Oral pills</b> (Ethinyl estradiol 30 mcg +levonorgestrel 150 mcg)	5
66	ORS 4.25 gm. oral pwrdr	1

รายการยาในบัญชียา รพ.สต. CUPพาน ประจำปี 2566

ที่	รายการยา	หน้า
67	ORS 6.975 gm. oral powdr	1
68	Paracetamol 325 mg. tab	3
69	Paracetamol 500 mg. tab	3
70	Paracetamol 120 mg./ 5 ml. (60ml) syr	3
71	Povidine sol. 10% 500 ml.	4
72	Povidine scrub. 7.5% 500 ml.	4
73	Roxithromycin 150 mg. tab	4
74	Salbutamol 2 mg. tab	2
75	Salbutamol 2 mg./ 5 ml. (60ml) syr	2
76	Senna tab	2
77	Silver sulfadiazine cream 1% 25gm.	9
78	Simeticone 80 mg. chew tab	1
79	Simeticone drop 40 mg/0.6ml (15ml)	1
80	Sodium bicarbonate eardrop 3% (10 ml)	8
81	Special mouthwash (smw) 180 ml.	8
82	Triamcinolone cream 0.02% ( 5 g.)	9
83	Triamcinolone cream 0.1% ( 5 g.)	9
84	Triamcinolone cream 0.1% ( 15 g.)	9
85	Triamcinolone cream 0.1% ( 15 g.)	9
86	Triamcinolone Oral paste 0.1% ( 5 g.)	8
87	Triferdine 150 mg. tab	6
88	Vitamin B1 100 mg. tab	6
89	Water for injection 100 ml. (bot)	5
90	EPI Vaccine	10
	รายการยาช่วยชีวิต	
91	Adrenaline 1 mg./ml. (amp.)	11
92	Cpm 10 mg./ml.	11
93	Dexamethasone 4 mg./ml. (amp.)	11
94	Glucose 50% in 50 ml. (amp.)	11
95	Isosorbide mononitrate 5 mg. SL tab	11

## บัญชียาสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ประจำปี 2566

### เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพาน จ.เชียงราย

#### กลุ่มยา 1 Gastro-intestinal system

##### 1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

2.	Simeticone (Simethicone)	chewable tab, susp	ก
3.	Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simeticone 25-50 mg	chewable tab, tab, susp	ก
4.	Compound Cardamom Mixture (Mist Carminative) เฉพาะสูตรที่ไม่มี sodium bicarbonate	mixt, mixt (hosp)	ก

##### 1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

2.	Domperidone	tab (as base/maleate), susp (as base/maleate)	ก
<b>คำเตือนและข้อควรระวัง</b>			
ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยอายุมากกว่า 80 ปี และไม่ใช้ยาขนาดเกินกว่า 30 mg ต่อวัน			
3.	Hyoscine butylbromide (Hyoscine-n-butylbromide)	tab, syr, sterile sol	ก

##### 1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

1.	Omeprazole	EC cap (as base)	ก
----	------------	------------------	---

##### 1.4 Drugs used in acute diarrhea

1.	Oral rehydration salts (ORS)	oral powdr, oral powdr (hosp)	ก	
เมื่อผสมน้ำแล้วมีตัวยาสำคัญต่อลิตร ดังนี้				
-	Sodium chloride	2.6 g	- Trisodium citrate dihydrate	2.9 g
-	Potassium chloride	1.5 g	- Glucose	13.5 g
และมี molar concentration ต่อลิตรดังนี้				
-	Glucose	75 mEq	- Sodium	75 mEq
-	Chloride	65 mEq	- Potassium	20 mEq
-	Citrate	10 mmol	- Osmolarity	245 mOsm

##### คำแนะนำ

การชดเชยสารน้ำและเกลือแร่เป็นเป้าหมายสำคัญในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาด้านแบคทีเรียในผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นสิ่งไม่จำเป็นและควรหลีกเลี่ยง

## 1.6 Laxatives

1.	Bisacodyl	EC tab	ก
5.	Magnesium hydroxide	tab, susp, susp (hosp)	ก
7.	Senna	tab	ก

## กลุ่มยา 3 Respiratory system

### 3.1 Bronchodilators

#### 3.1.1 Adrenoceptor agonists

2.	Salbutamol sulfate	tab, aqueous sol,	ก
----	--------------------	-------------------	---

#### 3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

1.	Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide	sol for nebulizer	ก
----	--	-------------------	---

### 3.4 Antihistamines

ไม่ควรใช้ antihistamines เป็นประจำ (routinely) ในโรคหวัด (common cold) เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก (placebo)

2.	Chlorpheniramine maleate (Chlorphenamine maleate)	cap, tab, syr, sterile sol	ก
4.	Hydroxyzine hydrochloride	tab	ก

### 3.6 Cough preparations

#### 3.6.1 Cough suppressants

1.	Dextromethorphan hydrobromide	tab, syr	ก
2.	Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound (Brown Mixture ; Mist. Tussis)	mixt (hosp)	ก

#### 3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

ยาละลายเสมหะ (mucolytics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากไม่มีประสิทธิผลทางคลินิกที่ชัดเจน

1.	Ammonium carbonate and senega mixture	mixt (hosp)	ก
2.	Glyceryl guaiacolate	tab, syr	ก

### 3.8 Other respiratory preparations

1.	Aromatic Ammonia Spirit	spirit, spirit (hosp)	ก
----	-------------------------	-----------------------	---

## กลุ่มยา 4 Central nervous system

### 4.1 Hypnotics and anxiolytics

ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจากควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้ยาเกินความจำเป็นมักนำไปสู่ปัญหาการติดยา

- |                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| 7. Hydroxyzine hydrochloride | tab, syr | ข |
|------------------------------|----------|---|

### 4.5 Drugs used in nausea and vertigo

#### 4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

- |                |  |   |
|----------------|--|---|
| 1. Domperidone | tab (as base/maleate),<br>susp (as base/maleate) | ก |
|----------------|--|---|

#### 4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Dimenhydrinate                              | compressed tab, film coated tab,<br>syr, sterile sol | ก |
| 2. Betahistine mesilate (Betahistine mesylate) | tab (เฉพาะ 6 และ 12 mg)                              | ข |

### 4.6 Analgesics and antipyretics

- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1. Paracetamol (Acetaminophen)   | tab, syr              | ก |
| <b>หมายเหตุ</b>  |                       |   |
| แนะนำให้ใช้เป็น first-line drug สำหรับ osteoarthritis  |                       |   |
| 3. Ibuprofen   | film coated tab, susp | ก |
| <b>คำเตือนและข้อควรระวัง</b>   |                       |   |
| 1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน |                       |   |
| 2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น  |                       |   |
| 3. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก   |                       |   |

### 4.7 Analgesics

#### 4.7.3 Antimigraine drugs

##### 4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

- |                                |                 |   |
|--------------------------------|-----------------|---|
| 1. Paracetamol (Acetaminophen) | tab             | ก |
| 3. Ibuprofen                   | film coated tab | ก |

## กลุ่มยา 5 Infections

### 5.1 Antibacterial drugs

#### 5.1.1 Penicillins

- |    |                        |              |   |
|----|------------------------|--------------|---|
| 1. | Amoxicillin trihydrate | cap, dry syr | ก |
| 4. | Dicloxacillin sodium   | cap, dry syr | ก |

#### 5.1.5 Macrolides

- |    |               |                                |   |
|----|---------------|--------------------------------|---|
| 3. | Roxithromycin | cap/tab (เฉพาะ 100 และ 150 mg) | ก |
|----|---------------|--------------------------------|---|

#### 5.1.6 Quinolones

- |    |             |     |   |
|----|-------------|-----|---|
| 1. | Norfloxacin | tab | ก |
|----|-------------|-----|---|

#### 5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

- |    |  |                             |   |
|----|--|-----------------------------|---|
| 1. | Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole) | cap, tab, susp, sterile sol | ก |
|----|--|-----------------------------|---|

### 5.2 Antifungal drugs

- |    |          |           |   |
|----|----------|-----------|---|
| 3. | Nystatin | oral susp | ก |
|----|----------|-----------|---|

### 5.4 Antiprotozoal drugs

#### 5.4.2 Other antiprotozoal drugs

- |    |               |  |   |
|----|---------------|--|---|
| 1. | Metronidazole | cap/tab (as base), susp (as benzoate), sterile sol (as base) | ก |
|----|---------------|--|---|

#### เจือจาง

ใช้สำหรับ amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis

### 5.5 Anthelmintics

- |    |             |           |   |
|----|-------------|-----------|---|
| 1. | Albendazole | tab, susp | ก |
| 4. | Niclosamide | tab       | ก |

### 5.6 Antiseptics

- |    |                         |                             |   |
|----|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Chlorhexidine gluconate | sol (aqueous) (เฉพาะ 4%)    | ก |
| 2. | Ethyl alcohol           | sol, sol (hosp), gel (hosp) | ก |
| 4. | Hydrogen peroxide       | sol                         | ก |
| 6. | Povidone-iodine         | sol, sol (hosp)             | ก |



## กลุ่มยา 7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders

### 7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

- |                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 1. Clotrimazole | vaginal tab | ก |
|-----------------|-------------|---|

### 7.3 Contraceptives

- |                                      |                          |   |
|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 2. Ethinylestradiol + Levonorgestrel | tab (เฉพาะ 30 + 150 mcg) | ก |
| 4. Medroxyprogesterone acetate       | sterile susp             | ก |

## กลุ่มยา 9 Nutrition and blood

### 9.2 Fluids and electrolytes

- |   |             |   |
|---|-------------|---|
| 2. Glucose with/without sodium chloride | sterile sol | ก |
| 9. Sodium chloride                      | sterile sol | ก |
| 10. Water for injection                 | sterile sol | ก |

### 9.3 Vitamins

Multivitamins ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีวิตามินเป็นส่วนประกอบเท่านั้น การผสมแร่ธาตุ (mineral) หรือตัวยาสำคัญอื่น ๆ ไม่ถือเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

- |                  |         |   |
|------------------|---------|---|
| 1. Folic acid    | cap/tab | ก |
|                  | 5 mg)   |   |
| 3. Multivitamins | syr     | ก |

มีวิตามินอย่างน้อย 8 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้

- |                          |                  |                           |           |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| - Vitamin A              | 1,000 – 1,167 IU | - Vitamin B <sub>6</sub>  | ≥ 0.6 mg  |
| - Vitamin D              | 600 - 2,500 IU   | - Vitamin B <sub>12</sub> | ≥ 1.2 mcg |
| - Vitamin B <sub>1</sub> | ≥ 0.6 mg         | - Niacinamide             | ≥ 8 mg    |
| - Vitamin B <sub>2</sub> | ≥ 0.6 mg         | - Vitamin C               | ≥ 40 mg   |

หมายเหตุ

- มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 1 – 8 ปี
- ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย(ช้อนชา) ที่รับประทานต่อครั้ง



5. Multivitamins	cap, tab	ก
มีวิตามินอย่างน้อย 9 ชนิดที่ให้ปริมาณยาต่อวัน ดังนี้		
- Vitamin A	2,000 - 5,600 IU	- Vitamin B <sub>12</sub> ≥ 2.4 mcg
- Vitamin D	600 - 4,000 IU	- Niacinamide ≥ 16 mg
- Vitamin B <sub>1</sub>	≥ 1.2 mg	- Folic acid 300-1000 mcg
- Vitamin B <sub>2</sub>	≥ 1.3 mg	- Vitamin C ≥ 100 mg
- Vitamin B <sub>6</sub>	≥ 1.3 mg	

#### หมายเหตุ

1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่
2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย (เม็ด) ที่รับประทานต่อครั้ง

7. Vitamin B <sub>1</sub> (Thiamine as hydrochloride or mononitrate)	tab (เฉพาะ 10-100 mg), sterile sol (เฉพาะ 100 mg/ml)	ก
---	---	---

## 9.5 Minerals

1. Calcium carbonate	cap, tab	ก
10. Ferrous fumarate	cap, tab, oral sol, susp	ข

## 9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

1. Ferrous fumarate	tab (เฉพาะ 65 mg as iron)	ก
<b>คำเตือนและข้อควรระวัง</b>		
1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน		
2. ระวังการแพ้ยาในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย		
3. Folic acid	cap/tab	: 5 mg) ก

#### เงื่อนไข

1. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทตลอดการตั้งครรภ์
2. ใช้สำหรับเสริมโฟเลทในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร
3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรที่มีภาวะ neural tube defect หรือปากแหว่งเพดานโหว่ ควรใช้ความแรง 5 mg

5. Ferrous salt + Folic acid + Potassium Iodide	tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine)	ก
---	---	---

#### เงื่อนไข

1. ใช้เสริมธาตุเหล็ก โฟเลท และไอโอดีนตลอดการตั้งครรภ์
2. ใช้สำหรับเสริมธาตุเหล็ก โฟเลท และไอโอดีนในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร
3. ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

#### คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
2. ระวังการแพ้ยาในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

## กลุ่มยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

### 10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

#### 10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

- |    |                   |                       |   |
|----|-------------------|-----------------------|---|
| 2. | Diclofenac sodium | EC tab, sterile sol   | ก |
| 3. | Ibuprofen         | film coated tab, susp | ก |

#### คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน
2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
3. ระวังการเกิดแผลในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก

## กลุ่มยา 11 Eye

### 11.1 Anti-infective eye preparations

#### 11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

1. ใช้เป็นยาสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น
  2. ควรใช้ยาให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อ เช่น ชนิดกรัมบวก หรือกรัมลบ
- |    |                 |          |   |
|----|-----------------|----------|---|
| 2. | Chloramphenicol | eye drop | ก |
|----|-----------------|----------|---|

### 11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

- |    |  |          |   |
|----|--|----------|---|
| 1. | Antazoline hydrochloride<br>+ Tetrahydrozoline hydrochloride | eye drop | ก |
|----|--|----------|---|

<b>กลุ่มยา 12 Ear, nose, oropharynx and oral cavity</b>
---

### 12.1 Drugs acting on the ear

#### 12.1.3 Other drugs acting on the ear

- |                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| 1. Sodium bicarbonate | ear drop (hosp) | ก |
|-----------------------|-----------------|---|

### 12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

#### 12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer

- |                            |            |   |
|----------------------------|------------|---|
| 5. Triamcinolone acetonide | oral paste | ก |
|----------------------------|------------|---|

#### 12.3.5 Other dental preparations

- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 4. Sodium chloride  | sterile sol          | ก |
| 5. Special mouthwash<br>ที่มีตัวยาสําคัญคือ chloroxylenol | mouthwash sol (hosp) | ก |

## กลุ่มยา 13 Skin

### 13.1 Anti-infective skin preparations

#### 13.1.1 Antibacterial preparations

- |  |       |   |
|--|-------|---|
| 1. Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine) | cream | ก |
|--|-------|---|

#### 13.1.2 Antifungal preparations

- |                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| 3. Clotrimazole | cream | ก |
|-----------------|-------|---|

#### 13.1.3 Parasiticial preparations

- |                    |                             |   |
|--------------------|-----------------------------|---|
| 1. Benzyl benzoate | emulsion/lotion (เฉพาะ 25%) | ก |
|--------------------|-----------------------------|---|

### 13.3 Topical antipruritics

- |             |                       |   |
|-------------|-----------------------|---|
| 1. Calamine | lotion, lotion (hosp) | ก |
|-------------|-----------------------|---|

#### หมายเหตุ

หากในสูตรตำรับยา มี phenol เป็นส่วนประกอบ ต้องมีความเข้มข้นของ phenol ไม่เกิน 0.5 - 1%

### 13.4 Topical corticosteroids

ควรระมัดระวังการใช้ยาทาสเตียรอยด์ที่มีความแรงสูงและสูงมากในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณรอบดวงตา ข้อพับต่าง ๆ เยื่อบุปาก ทวาร และอวัยวะเพศ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีผิวหนังบางจึงอาจมีผลข้างเคียงต่อผิวหนังบริเวณที่ทายา และยาอาจถูกดูดซึมทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็น systemic side-effect ได้

- |                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| 5. Triamcinolone acetonide | cream, cream (hosp), lotion, lotion (hosp) | ก |
|----------------------------|--|---|

## กลุ่มยา 14 Immunological products and vaccines

2.	BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin)	inj	ก
4.	Diphtheria-Tetanus vaccine ทั้งชนิด DT (children type) และ dT (adult type)	inj	ก
5.	Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (whole cell) (DTPw)	inj	ก
6.	Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B vaccine (DTP-HB)	inj	ก
7.	Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b vaccine (DTP-HB-Hib)	inj	ก
8.	Hepatitis B vaccine (HB)	inj	ก
9.	Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก

### เงื่อนไข

1.	บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย		
2.	ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน		
3.	บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป		
4.	หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป		
5.	เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี		
6.	ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้		
7.	โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)		
8.	ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร		
10.	Influenza vaccine ชนิด pandemic influenza สายพันธุ์ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี		ก
11.	Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR)	inj	ก
12.	Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV) ชนิด bivalent และ trivalent	oral sol, oral susp	ก
13.	Inactivated polio vaccine (IPV) (เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว)	inj	จ(1)

### เงื่อนไข

ใช้สำหรับโครงการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย ตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอในระดับโลก ของกรมควบคุมโรค โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้จ่ายตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

18.	Tetanus vaccine (Tetanus toxoid)	inj	ก
20.	Japanese encephalitis vaccine, live attenuated (Live Attenuated JE vaccine)	inj	ก
26.	Rotavirus vaccine	oral form (for pediatric use)	ก

## กลุ่มยา 15 Anaesthesia

### 15.2 Local anaesthesia

2. Lidocaine hydrochloride

sterile sol

ก

## กลุ่มยาช่วยชีวิตตามคู่มือมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2566

บรรจุในกล่อง Emergency Box มี 5 รายการ ดังนี้

- |                             |                |   |
|-----------------------------|----------------|---|
| 1. Adrenalin (Epinephrine)  | sterile sol    | ก |
| 2. Dexamethasone            | sterile sol    | ก |
| 3. Chlorpheniramine maleate | sterile sol    | ก |
| 4. Glucose                  | sterile sol    | ก |
| 5. Isosorbide dinitrate     | sublingual tab | ก |



## รายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564  
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นรายการบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง รายการยาจากสมุนไพรสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข โดยมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้อนุมัติไว้ หรือเป็นรายการยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับ โรงพยาบาล (รพ.) ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ซึ่งประกอบด้วย บัญชีย่อย 3 บัญชี ได้แก่ บัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3

**บัญชี 1 หมายความว่า** รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ (health benefits) หรือข้อบ่งใช้ (clinical indication) มีประสิทธิผลการใช้ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ สามารถใช้ในสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น

1.1 ไม่มีเงื่อนไขการใช้

1.2 มีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ระดับสถานพยาบาล

**บัญชี 2 หมายความว่า** รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย

**บัญชี 3 หมายความว่า** รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบต่อไปนี้

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและงบประมาณ

2. นำเสนอโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย

2.1 บทสรุปผู้บริหาร

2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ รวมทั้งที่มาของการพัฒนาสูตรตำรับ (ถ้ามี)

2.3 มีวัตถุประสงค์

2.4 วิธีการดำเนินโครงการ

2.5 กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการชัดเจน

2.6 ต้องมีการระบุ สรรพคุณเฉพาะ (specific health benefits) หรือข้อบ่งใช้

(clinical indication) และกำหนดวิธีใช้ยา ให้ชัดเจน

2.7 แนวทางการติดตามประเมินผลการใช้ยาทั้งด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย โดยมีการรายงาน ความปลอดภัยไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC) ในทุกรายที่พบ

2.8 มีแนวทางการติดตามความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย

2.9 มีหนังสือแสดงความจำนงในการรับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานภาครัฐ

3. ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรทุก 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ

โดยรายการยาจากสมุนไพรประกอบด้วย ชื่อยา รูปแบบยา และบัญชีย่อย นอกจากนั้นอาจระบุเงื่อนไข และ/หรือหมายเหตุ และ/หรือความแรง ไว้ด้วย