

ตารางขนาดการใช้ยาในเด็กแบ่งตามอายุ หรือน้ำหนัก (ยารับประทาน)

| ยา   | ขนาดแนะนำ  | เทียบเท่า                      | ขนาดการใช้ยา (ml/dose) ตาม BW (Kg) |             |               |              |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|  |  |                                | 5                                  | 10          | 15            | 20           |
| Actifed Syr 30mg of pseudo/5ml                 | 4MKD of pseudoephe, tid  | 0.23ml/kg/dose x3              | 1.15                               | 2.30        | 3.45          | 4.60         |
| Albendazole 200mg/5ml                          | 1 ปี - <2 ปี = 200 mg, OD  | 5ml/dose, OD                   |                                    |             |               |              |
|  | ≥2 ปี = 400 mg, OD   | 10ml/dose, OD                  |                                    |             |               |              |
| AlumMilk (Belcid <sup>®</sup> ) (Al/Mg/Simeth) | 0.5-1 ml/kg/dose (max30 ml)  |                                | 2.5-5                              | 5-10        | 7.5-15        | 10-20        |
| Ambroxol HCl 30mg/5ml                          | ขนาดตามอายุ : อายุต่ำกว่า 2 ปี =1.25ml bid, 2-5 ปี = 1.25ml tid, 5-10 ปี=2.5 ml tid, 10 ปี และผู้ใหญ่ = 5ml bid/tid  |                                |                                    |             |               |              |
| Ammon Carb. 0.02g/5ml+Glycerrhiza              | ขนาดตามอายุ : เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร), เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา ( 5 มิลลิลิตร), เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร) วันละ 3-4 ครั้ง |                                |                                    |             |               |              |
| Amoxi/Clav 200+28.5 mg/5ml                     | 40MKD, bid   | 0.5ml/Kg/dose x3               | 2.5                                | 5           | 7.5           | 10           |
| Amoxicillin 125mg/5ml                          | 20-40MKD, tid  | 0.27-0.54ml/Kg/dose x3         | 1.35-2.70                          | 2.70-5.40   | 4.05-8.10     | 5.4-10.80    |
| Atarax Syr 10mg/5ml                            | 0.6MKdose, tid   | 0.3ml/kg/dose x3               | 1.5                                | 3           | 4.5           | 6            |
| Buscopan 5mg/5ml (Hyoscine-N-ButylBr)          | ส่วนใหญ่แนะนำในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป /กินต่อครั้งตามอายุดังนี้ 1-12 เดือน : ½ ชช., 1-3 ปี : 1 ชช., 3-6 ปี : 1-2 ชช., >6 ปี : 1-2 เม็ด  |                                |                                    |             |               |              |
| Bactrim (Co-Trimoxazole) (40mgT/200mgS)        | 6-12mg of T/kg/day, bid  | 0.38-0.75ml/kg/dose, bid       | 1.9-3.75                           | 3.8-7.5     | 5.7-11.25     | 7.6-15       |
| CPM Syr 2mg/5ml                                | 0.35MKD, tid   | 0.29ml/kg/dose x3              | 1.45                               | 2.90        | 4.35          | 5.80         |
| Domperidone 5mg/5ml                            | 0.2-0.4MKdose, tid   | 0.2-0.4ml/kg/dose x3           | 1-2                                | 2-4         | 3-6           | 4-8          |
| Erythromycin Estolate 125mg/5ml                | 20-50MKD, qid  | 0.2-0.5ml/kg/dose x4           | 1- <u>2.5</u>                      | 2- <u>5</u> | 3- <u>7.5</u> | 4- <u>10</u> |
| Ferrous Fumarate 15mg element/0.6ml            | Prophylaxis : 1-2MKD, OD   | 0.04-0.08ml/kg/dose, <u>OD</u> | 0.2-0.4                            | 0.4-0.8     | 0.6-1.2       | 0.8-1.6      |
|  | Iron deficiency anemia :<br>6MKD, tid  | 0.08ml/kg/dose x3              | 0.4                                | 0.8         | 1.2           | 1.6          |

| ยา  | ขนาดแนะนำ  | เทียบเท่า               | ขนาดการใช้ยา (mL/dose) ตาม BW (Kg) |           |             |           |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
|   |  |                         | 5                                  | 10        | 15          | 20        |
| Glyceril Guaiacolate 100mg/5ml                | ขนาดตามอายุ : [อายุต่ำกว่า 2 ปี =0.125-0.25mL/kg/dose], [2-6 ปี = 2.5mL/dose x4],<br>[6-12 ปี=5mL/dose x4], [12 ปี ขึ้นไป = 10mL/dose x4]  |                         |                                    |           |             |           |
| Ibuprofen 100mg/5ml                           | 5-10 MKdose  | 0.25-0.5mL/kg/dose x3-4 | 1.25-2.5                           | 2.5-5     | 3.75-7.5    | 5-10      |
| M.Carminative                                 | [เด็ก = 5-15mL/dose ,tid-qid], [ผู้ใหญ่ 15-30mL/dose, tid-qid]   |                         |                                    |           |             |           |
| M.Tussis                                      | [เด็ก 6-12 ปี ครั้งละ 2.5-5 ml, tid-qid], [ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ครั้งละ 5-10 ml, tid-qid] (ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี)   |                         |                                    |           |             |           |
| Milk of Magnesia 1.2g/15ml                    | ขนาดตามอายุ : [อายุต่ำกว่า 2 ปี =0.5mL/kg/dose, hs/ตื่นนอนเช้า], [2-5 ปี = 5-15mL/dose ,hs/ตื่นนอนเช้า],<br>[6-12 ปี=15-30mL/dose, hs/ตื่นนอนเช้า], [12 ปี ขึ้นไป = 30-60mL/dose ,hs/ตื่นนอนเช้า]  |                         |                                    |           |             |           |
| MTV syr (Vistar <sup>®</sup> )                | 5-10 mL/day, OD-bid  |                         |                                    |           |             |           |
| Norfloracin 100 mg/tab                        | 15-20MKD, bid  | 7.5-10 mg/kg/dose, bid  | 37.5-50 mg                         | 75-100 mg | 112.5-150mg | 150-200mg |
| Paracetamol 120mg/5ml                         | 10-15MKdose, q4-6h   | 0.41-0.62 mL/kg/dose    | 2.1-3.1                            | 4.1-6.2   | 6.1-9.3     | 8.2-12.4  |
| Penicillin V 2 แสนยูนิต/5ml (125mg/5ml)       | 25-50MKD, qid  | 0.25-0.5mL/kg/dose x4   | 1.25-2.5                           | 2.5-5.0   | 3.75-7.5    | 5.0-10.0  |
| Pyrantel Pamoate 50mg base/1ml                | 11 mg base/kg, single (max=1g)   | 0.22mL/kg/dose, single  | 1.1                                | 2.2       | 3.3         | 4.4       |
| Salbutamol 2mg/5ml                            | 0.1 MKdose (max=2mg) q6h   | 0.25mL/kg/dose          | 1.25                               | 2.5       | 3.75        | 5.0       |
| Simethicone 40mg/0.6ml                        | ขนาดตามอายุ : [อายุต่ำกว่า 2 ปี =20mg/dose, qid prn หรือ 0.3mL/dose], [2-12 ปี = 40mg/dose qid prn หรือ 0.6mL/dose]  |                         |                                    |           |             |           |
| Sodium Bicarbonate 50mg/5ml (มี Alcohol 1.9%) | ขนาดและวิธีใช้ ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง<br>เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อนชา, เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อนชา, เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา,<br>ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้ |                         |                                    |           |             |           |
| Theophylline 150mg/15ml                       | 4-5 mg/kg/dose q6h   | 0.4-0.5 mL/kg/dose      | 2-2.5                              | 4-5       | 6-7.5       | 8-10      |

## สรุป

| 10 Kg ครั้งซ็อนซา | 10 Kg 1 ซ็อนซา | 10 Kg ครั้ง-1 ซ็อนซา                              | พิเศษ                         |
|-------------------|----------------|---|-------------------------------|
| Actifed           | Amoxi/Clav     | Ibuprofen   | Albendazole                   |
| Atarax            | Amoxi          | อาจให้ salbutamol อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย<br>ในบางกรณี | Alum Milk                     |
| CPM               | Erythromycin   |   | Ambroxol                      |
| Domperidone       | Bactrim        |   | Ammon Carb                    |
| Salbutamol        | Erythromycin   |   | Buscopan                      |
|                   | Paracetamol    |   | Ferrous fumarate (Fer-in-sol) |
|                   | Penicillin V   |   | Glyceryl Guaiacolate          |
|                   | Theophylline   |   | M.Carminative                 |
|                   |                |   | M.Tussis                      |
|                   |                |   | MOM                           |
|                   |                |   | MTV                           |
|                   |                |   | Norfloxacin                   |
|                   |                |   | Pyrantel                      |
|                   |                |   | Simethicone                   |
|                   |                |   | Sodium Bicarbonate            |