

<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน</p>	<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน</p>
<p>ถ้า CENTOR CRITERIA score รวม ≥ 4 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ และ ให้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ โรคหัวใจรูห์มาติก</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ไม่ไอ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ต่อม้ำเหลืองที่คออักเสบ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไข้ > 38 องศา = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 4. หนองที่ต่อมทอลซิล หรือ ทอลซิลโต = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 5. อายุ 3-14 ปี = 1, 15-44 ปี = 0, ≥ 45 ปี = -1</p> <p>ผู้ตรวจ.....</p>	<p>ถ้า CENTOR CRITERIA score รวม ≥ 4 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ และ ให้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ โรคหัวใจรูห์มาติก</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ไม่ไอ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ต่อม้ำเหลืองที่คออักเสบ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไข้ > 38 องศา = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 4. หนองที่ต่อมทอลซิล หรือ ทอลซิลโต = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 5. อายุ 3-14 ปี = 1, 15-44 ปี = 0, ≥ 45 ปี = -1</p> <p>ผู้ตรวจ.....</p>
<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน</p>	<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน</p>
<p>ถ้า CENTOR CRITERIA score รวม ≥ 4 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ และ ให้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ โรคหัวใจรูห์มาติก</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ไม่ไอ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ต่อม้ำเหลืองที่คออักเสบ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไข้ > 38 องศา = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 4. หนองที่ต่อมทอลซิล หรือ ทอลซิลโต = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 5. อายุ 3-14 ปี = 1, 15-44 ปี = 0, ≥ 45 ปี = -1</p> <p>ผู้ตรวจ.....</p>	<p>ถ้า CENTOR CRITERIA score รวม ≥ 4 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ และ ให้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ โรคหัวใจรูห์มาติก</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ไม่ไอ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ต่อม้ำเหลืองที่คออักเสบ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไข้ > 38 องศา = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 4. หนองที่ต่อมทอลซิล หรือ ทอลซิลโต = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 5. อายุ 3-14 ปี = 1, 15-44 ปี = 0, ≥ 45 ปี = -1</p> <p>ผู้ตรวจ.....</p>
<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน</p>	<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน</p>
<p>ถ้า CENTOR CRITERIA score รวม ≥ 4 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ และ ให้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ โรคหัวใจรูห์มาติก</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ไม่ไอ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ต่อม้ำเหลืองที่คออักเสบ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไข้ > 38 องศา = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 4. หนองที่ต่อมทอลซิล หรือ ทอลซิลโต = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 5. อายุ 3-14 ปี = 1, 15-44 ปี = 0, ≥ 45 ปี = -1</p> <p>ผู้ตรวจ.....</p>	<p>ถ้า CENTOR CRITERIA score รวม ≥ 4 พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ และ ให้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ โรคหัวใจรูห์มาติก</p> <p><input type="checkbox"/> 1. ไม่ไอ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 2. ต่อม้ำเหลืองที่คออักเสบ = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 3. ไข้ > 38 องศา = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 4. หนองที่ต่อมทอลซิล หรือ ทอลซิลโต = 1</p> <p><input type="checkbox"/> 5. อายุ 3-14 ปี = 1, 15-44 ปี = 0, ≥ 45 ปี = -1</p> <p>ผู้ตรวจ.....</p>

<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ Fresh Traumatic Wound (แผลสดไม่เกิน 6 ชั่วโมง)</p>	<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ Fresh Traumatic Wound (แผลสดไม่เกิน 6 ชั่วโมง)</p>
<p>มีอย่างน้อย 1 ข้อพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. แผลขอบไม่เรียบ เย็บแผลได้ไม่สนิท <input type="checkbox"/> 2. แผลจากการบาดฉัด <input type="checkbox"/> 3. แผลลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก <input type="checkbox"/> 4. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ <input type="checkbox"/> 5. สัตว์กัด / คนกัด <input type="checkbox"/> 6. มีเนื้อตายบริเวณกว้าง <input type="checkbox"/> 7. มีสิ่งสกปรกอยู่ในแผลล้างออกไม่หมด <input type="checkbox"/> 8. ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำสกปรก <p style="text-align: right;">ผู้ตรวจ.....</p>	<p>มีอย่างน้อย 1 ข้อพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. แผลขอบไม่เรียบ เย็บแผลได้ไม่สนิท <input type="checkbox"/> 2. แผลจากการบาดฉัด <input type="checkbox"/> 3. แผลลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก <input type="checkbox"/> 4. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ <input type="checkbox"/> 5. สัตว์กัด / คนกัด <input type="checkbox"/> 6. มีเนื้อตายบริเวณกว้าง <input type="checkbox"/> 7. มีสิ่งสกปรกอยู่ในแผลล้างออกไม่หมด <input type="checkbox"/> 8. ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำสกปรก <p style="text-align: right;">ผู้ตรวจ.....</p>
<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ Fresh Traumatic Wound (แผลสดไม่เกิน 6 ชั่วโมง)</p>	<p>RDU (Rational Drug Use) กรณีควรใช้ยาปฏิชีวนะ Fresh Traumatic Wound (แผลสดไม่เกิน 6 ชั่วโมง)</p>
<p>มีอย่างน้อย 1 ข้อพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. แผลขอบไม่เรียบ เย็บแผลได้ไม่สนิท <input type="checkbox"/> 2. แผลจากการบาดฉัด <input type="checkbox"/> 3. แผลลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก <input type="checkbox"/> 4. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ <input type="checkbox"/> 5. สัตว์กัด / คนกัด <input type="checkbox"/> 6. มีเนื้อตายบริเวณกว้าง <input type="checkbox"/> 7. มีสิ่งสกปรกอยู่ในแผลล้างออกไม่หมด <input type="checkbox"/> 8. ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำสกปรก <p style="text-align: right;">ผู้ตรวจ.....</p>	<p>มีอย่างน้อย 1 ข้อพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. แผลขอบไม่เรียบ เย็บแผลได้ไม่สนิท <input type="checkbox"/> 2. แผลจากการบาดฉัด <input type="checkbox"/> 3. แผลลึกถึงกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก <input type="checkbox"/> 4. ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ <input type="checkbox"/> 5. สัตว์กัด / คนกัด <input type="checkbox"/> 6. มีเนื้อตายบริเวณกว้าง <input type="checkbox"/> 7. มีสิ่งสกปรกอยู่ในแผลล้างออกไม่หมด <input type="checkbox"/> 8. ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ น้ำสกปรก <p style="text-align: right;">ผู้ตรวจ.....</p>

